

PL 13 MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L'AIGUILLON (PL-PC)

46°09'-46°32'N, 00°31'-00°55'W

77 900 ha

0-25 m

Voir région Pays-de-Loire.

RNV 85 ha + 260 ha

RC 550 + 212 + 2100 = 2 862 ha

RN 206 ha

ZPS RC+RN = 3068 ha

SGC 340 ha

Baie littorale et estuaires, dunes de sable, pinèdes, vasières et prés salés sur la partie maritime. Cours d'eau, ripisylves, forêts inondables de frênes, impressionnant réseau de canaux (Venise verte), prairies humides et marais, bocages et cultures céréalières à l'intérieur des terres. Il s'agissait de la deuxième zone humide de France après la Camargue. Aujourd'hui considérablement altérée par le drainage, le remembrement et la mise en culture des prairies humides utilisées traditionnellement pour l'élevage.

Blongios nain (5-10 c.), **Bihoreau gris (100 c.)**, Aigrette garzette (73 c.), **Héron cendré (1100 c., R)**, **Héron pourpré (120 c., R)**, Cigogne blanche (1 c.), Oie cendrée (10 c.), Circaète Jeanle-Blanc (1 c.), Bondrée apivore (<10 c.), **Milan noir (diz.)**, **Busard des roseaux (diz.)**, **Busard cendré (diz.)**, **Marouette ponctuée (0-5 c.)**, Râle de genêts (0-10 c.), Echasse blanche (<10 c.), Oedicnème criard, **Guifette noire (40 c.)**, Hibou des marais (0-5 c.), Engoulevent d'Europe, Martin-pêcheur (10-50 c.), Pic cendré, Alouette calandrelle, Pipit rousseline et **Gorgebleue (300 c.)** sont les principaux nicheurs. *Site d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (>20 000, R)* : Grande Aigrette (<10), Oie des moissons (<10), Oie riieuse, Oie cendrée (500), Bernache cravant (30-1000), **Tadorne de Belon (4200-9100, R)**, **Canard siffleur (15-7900, R)**, Sarcelle d'hiver (550-2300), **Canard pilet (100-7900, R)**, **Canard souchet (55-410, R)**, Busard Saint-Martin (100), Faucon pèlerin, Faucon émerillon, Grue cendrée (diz.), **Avocette (540-8100, R)**, Pluvier doré (3000-8000), **Pluvier argenté (1000-3500, R)**, **Vanneau huppé (20 000-30 000, R)**, **Bécasseau maubèche (4000-10 300, R)**, **Bécasseau variable (11 000-23 000, R)**, **Barge à queue noire ssp. d'Islande (2700-6000, R)** et Hibou des marais (100) sont les principaux hivernants. **Spatule blanche (20, R)**, Cigogne noire (0-7), **Oie cendrée (2000, R)**, Bernache nonnette, Busard cendré (500), Balbuzard pêcheur, Marouette de Baillon, **Outarde canepetière (20-50)**, **Pluvier argenté (3400-4500, R)**, **Bécasseau maubèche (10 000-25 000, R)**, **Barge à queue noire (40 000-80 000, R)**, Barge rousse (350-1500), **Courlis corlieu (9000-17 000, R)**, Courlis cendré (400-2000), **Chevalier gambette (500-2000, R)**, Glaréole à collier, Mouette mélanocéphale, Mouette pygmée (1500-2000), Sterne caspienne, Sterne caugek (350), Sterne pierregarin (250), Sterne arctique, Guifette moustac, Guifette noire (200) et Phragmite aquatique observés en migration.

