



## BOIS DE LA FOYE

### COMMUNES

Bonneuil-Matours, Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne (86)

### DESCRIPTION ET INTERET DU SITE



Au cœur du Seuil du Poitou, entre Châtelleraut et Chauvigny, les Bois de Chitré constituent un vaste massif boisé s'étendant sur un plateau de la rive droite de la Vienne, au cœur duquel Le Bois de la Foye et les Brandes de la Dispute forment un sous-ensemble, objet de la présente ZNIEFF. Dans cet interfluve entre Vienne et Gartempe, les plateaux sont recouverts de limons formés au détriment d'argiles déposées au Tertiaire, surmontant le substratum de calcaires jurassiques qui peut affleurer localement (vallon de la Fontaine aux Vaches). Les sols dominants sur le plateau sont des "bornais", à réaction acide, plus ou moins imperméables et hydromorphes alors que, sur les pentes et au niveau du vallon de l'Hordin, dominent des sols argilo-calcaires à fort engorgement hivernal, une source en tête de vallon (la Fontaine aux Vaches) venant souligner la zone de contact entre les deux couches géologiques. Ce contexte pédologique contrasté explique la grande diversité d'habitats rencontrés sur le site et l'originalité de certains d'entre eux : chênaie calcifuge atlantique et landes de dégradation associées sur le plateau, chênaie-charmaie neutrocline sur pente et, surtout, tourbière alcaline à Choin occupant près d'un hectare au niveau du suintement incrustant de la Fontaine aux Vaches. Ainsi définie, la zone abrite une flore et une faune très diversifiées, parmi lesquelles les oiseaux, les amphibiens et les plantes à fleurs représentent les éléments les plus intéressants.



Sur le plan botanique, le joyau du site est sans conteste la tourbière alcaline de la Fontaine aux Vaches, un type de milieu rare et très localisé en Poitou-Charentes. C'est là en effet, entre les énormes touradons de Choin, que prospère une flore spécialisée, avec des espèces précieuses comme l'Orchis élevé et l'Epipactis des marais, deux orchidées rares inféodées aux marais calcaires ou la Gentiane peumonanthe, représentante isolée dans les plaines atlantiques d'un genre emblématique des pelouses alpines, accompagnés de tout un cortège de laïches typiques de ces milieux asphyxiants.

Le cortège des amphibiens est également très riche : il se signale notamment par la présence d'une population de Sonneur à ventre jaune - petit crapaud inféodé aux ornières forestières -, en forte régression partout en Europe de l'Ouest et dont moins de 10 stations sont connues aujourd'hui dans la Vienne. Il est accompagné sur le site par plusieurs autres espèces d'amphibiens, également rares en Poitou-Charentes, comme la Grenouille de Lesson ou le Triton marbré.



Quant à l'avifaune, elle se singularise par la présence d'un riche cortège d'oiseaux nicheurs inféodés aux landes et aux boisements ouverts, tels que l'Engoulevent d'Europe, la Fauvette pitchou ou le Busard St Martin.

## NIVEAU DE CONNAISSANCE

	Mammifères	Oiseaux	Reptiles	Amphibiens	Poissons	Insectes	Crustacés, Mollusques	Végétaux	Mousses, champignons
Niveau de prospection	0	2	2	2	0	0	0	3	0
Espèces observées	0	7	1	8	0	0	0	85	0
Esp.rares/menacées		5	0	5				11	

Niveau de prospection : 0 = pas de prospection ; 1 = prospection insuffisante ; 2 = prospection assez bonne ; 3 = bonne prospection

## MILIEUX DETERMINANTS ESSENTIELS

- 41 2 Chênaies-charmaies
- 54 2 Bas-marais alcalins
- 34 3 Pelouses permanentes denses
- 41 5 Chênaies acidiphiles
- 31 2 Landes sèches

## ESPECES DETERMINANTES : 21

### FAUNE

DH DO PN

#### Oiseaux

Bécasse des bois <i>Scolopax rusticola</i>			
Busard cendré <i>Circus pygargus</i>		✓	✓
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>		✓	✓
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>			✓
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i>		✓	✓

#### Amphibiens

Crapaud calamite <i>Bufo calamita</i>	✓		✓
Grenouille de Lesson <i>Rana lessonae</i>	✓		✓
Rainette verte <i>Hyla arborea</i>	✓		✓
Sonneur à ventre jaune <i>Bombina variegata</i>	✓		✓
Triton marbré <i>Triturus marmoratus</i>	✓		✓

### FLORE

DH PN PR

Cicendie fluette <i>Exaculum pusillum</i>			
Dryoptéris affine <i>Dryopteris affinis</i>			
Epipactis de Müller <i>Epipactis muelleri</i>			✓
Epipactis des marais <i>Epipactis palustris</i>			
Gentiane pneumonanthe <i>Gentiana pneumonanthe</i>			
Germandrée des marais <i>Teucrium scordium</i>			
Laîche puce <i>Carex pulicaris</i>			
Ophioglosse commun <i>Ophioglossum vulgatum</i>			
Orchis élevé <i>Dactylorhiza elata</i>			✓
Orchis incarnat <i>Dactylorhiza incarnata</i>			
Pulicaire vulgaire <i>Pulicaria vulgaris</i>		✓	

Légende : DH : espèce inscrite à la directive Habitats (Annexe II et/ou IV) ; DO : espèce inscrite à la directive Oiseaux (Annexe II) ; PN : espèce protégée en France ; PR : espèce protégée régionalement.

## AUTRES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ÉCOLOGIQUE

Aucun